

Hefe Efect S

Vedel leheväetis lämmastiku ja väävliga N + (SO₃) 15-0-0 (56)

Leheväetis Efect S on väävlit sisaldav leheväetis kõikidele kultuuridele ennetamiseks ja kõrvaldamaks spetsiifilisi puudushaigusi.

Toote koostis ja eelkõige selle lämmastiku ja väävlisalduse suhe sobib hästi teraviljade saagikvaliteedi (proteiini) parandamiseks ja tõstmiseks. Efect S on ohutuks kasutamiseks ja käitlemiseks valmis vedel leheväetis.

Preparaadi koostis:

| Nimetus | Sisaldus g/l | Sisaldus % |
|--|-----------------|---------------|
| Üldlämmastik (N) | 207 | 15,5 |
| Ammooniumlämmastik (NH ₄ ⁺ -N) | 134 | 10,02 |
| Karbamiidlämmastik (NH ₂ -N) | 73,0 | 5,42 |
| Väävel (SO ₃) | 750 | 56,0 |

Kasutamine ja kulunorm:

Parimate tulemuste saamiseks kasutage piisavalt vett, et saavutada põllukultuuride parim kattuvus. Vältida pritsimist tugeva päikesekiirguse ja/või kõrgete temperatuuride korral. Võimalusel pritsida õhtuti või varahommikul, eriti kui päeval ajal temperatuur ületab +28°C.

| Kultuurid | Kulunorm l/ha | Max. kontsent- ratsioon % | Soovitav pritsimise periood |
|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|---|
| Teravili väävlipuudusel | 1,0 | 5,0 | Pritsida 1 - 2 korda alates taimede tärkamisest kuni lipulehe väljumiseni. |
| Teravili, kvaliteedi tõstmiseks | 1,0-2,0 | 5,0 | Pritsida alates 2. kõrresõlme moodustumisest kuni lipulehe väljumiseni. |
| Raps | 1,0-2,0 | 5,0 | Pritsida 1-2 korda varsumise algusest kuni õitsemiseni. |
| Suhkrupeer | 2,0 | | Pritsitakse 1-2 korda alates lehtede arengust kuni leheridade kokkukasvamiseni. |
| Mais | 3,0-5,0 | | Pritsida 1-3 korda 4-8 lehe faasis, 10-14 päevase intervalliga. |
| Köögiljad | 5,0 | | Pritsida kasvuperioodi jooksul, 8-12 päevase intervalliga. |

Soovitav vee kogus: pritsimisel kasutada vähemalt 200-300 l/ha.

Paagisegud: Mitte segada happeliste toodetega. Mitte kasutada paagisegus pH reguleerivaid vahendeid.