

YaraVita® KombiPhos

Fosforvæetis lehekaudseks vâetamiseks.

Preparaadi koostis:

Nimetus	Sisaldus g/l	Sisaldus %
Difosforpentaoksiid (P ₂ O ₅)	440,0	29,8
Kaaliumdioksiid (K ₂ O)	75,0	5,1
Magneesiumoksiid (MgO)	67,0	4,5
Mangaan (Mn)	10,0	0,68
Tsink (Zn)	5,0	0,34

Kasutamine ja kulunorm:

Teraviljad: pinnase madal temperatuur kevadel, suur energiatarve võrsumise ja kõrsumise ajal, suur vajadus terve ja aktiivse lipulehe järele, mis pikendaks terade täitumise perioodi – kõigi nende vajaduste täitmist toetab efektiivselt lehekaudne vâetamine YaraVita® KombiPhos'iga.

Mais: pinnase madal temperatuur jahedal kevadel põhjustab maisil sageli klassikalisi fosforipuuduse sümptomeid. YaraVita® KombiPhos kasutamine varastes arengustaadiumites aitab kultuurtaimedel stressist toibuda ja edasiseks arenguks vajalikku tõhusat juuresüsteemi moodustada.

Kartul: reageerib lehekaudsele fosforvâetisele väga hästi. Kasvab müügikõlbliku saagi kogus ja suurenevad mugulate mõõtmed. Mugulate arenemise ajal kaotavad juured oma tõhususe ja fosfor läheb võrsetest üle mugulatesse. YaraVita® KombiPhos'i kasutamisega on võimalik fosfori kontsentratsiooni taimes hoida, pikendades sellevõrra mugulate kasvamisperioodi.

Kultuurid	Kulunorm l/ha	Soovitav pritsimise periood
Teraviljad	3,0-5,0	Kasutada alates 2. lehe faasist kuni 1. kõrresõlme moodustumiseni (kasvufaas 12-31). Vajadusel korrata pritsimist alates viljapeade moodustumisest kuni õitsemiseni (kasvufaas 51-69).
Mais	3,0-5,0	Kasutada 4-8. lehe faasis. Vajadusel korrata pritsimist 10–14 päeva möödudes.
Kartul	3,0-5,0	Kasutada üks nädal pärast täielikku tärkamist. Suuremate mugulate saavutamiseks kasutada, kui esimesed mugulad on 10 mm suurusel, pritsimist korrata 10-14 päeva möödudes.

Soovitav vee kogus: pritsimisel kasutada vähemalt 200 l/ha.

Segamine

Kontrollige YaraVita® KombiPhos™i kasutamise sobivust paagisegus teiste YaraVita® leheväetiste ja taimekaitsevahenditega aadressil www.tankmix.com.